



SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL Nº 115/2023

ÁREA: Enfermagem na Atenção Básica e na Média Complexidade

PROVA ESCRITA

INSTRUÇÕES

1	Na parte inferior desta capa, escreva o seu nome completo de forma legível.
2	O candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação ou comissão de seleção, telefone celular desligado ou quaisquer equipamentos eletrônicos, também desligados, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado, sob pena de ser eliminado do processo seletivo.
3	A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato, assim como bolsas e sacolas, deverão ser mantidos embaixo da carteira até o término de suas provas. A embalagem somente poderá ser deslacrada fora do local de realização das provas.
4	Este Caderno contém 20 questões de múltipla escolha . Verifique se ele está completo. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
5	A Prova Objetiva (questões de múltipla escolha) vale 10,0 pontos e cada uma de suas questões tem o mesmo valor.
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
7	Somente é permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não será considerada a questão marcada com lápis grafite.
8	Utilize o verso das páginas deste Caderno para rascunhos.
9	Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha.
10	Será considerada como resposta definitiva a cada questão o preenchimento do Gabarito Final , na última folha do caderno de provas.
11	Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO

--

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

QUESTÃO 1) A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores nacionais de prioridade para a epidemiologia da saúde materno-infantil, pois muitas vezes mostra uma ineficiência na qualidade da assistência prestada no momento do nascimento e as fragilidades na assistência do neonato. Assim, é CORRETO afirmar:

- a) A equipe profissional responsável, no momento do nascimento, precisa investigar as condições de parto pré-termo e decidir pelo parto cesáreo da gestante.
- b) Um dos fatores de risco mais importantes para a mortalidade infantil é o baixo peso ao nascer, que deve ser considerado no valor menor que 2.000g.
- c) Além dos elementos do período gestacional, a equipe deve considerar que o principal fator de risco isolado é o baixo peso ao nascer, considerado um valor menor que 2.500g.
- d) Após o nascimento, a necessidade de reanimação depende da avaliação rápida das seguintes situações referentes à vitalidade do neonato: presença de mecônio e se o neonato está chorando ou respirando.

QUESTÃO 2) Recém-nascido a termo, de parto vaginal, 3.566 gramas, apresenta líquido amniótico com mecônio e sinais de asfixia logo após o nascimento. Selecione a questão CORRETA sobre a assistência desse neonato:

- a) Colocar o recém-nascido sob fonte de calor radiante, posicionar a cabeça, aspirar, secar, remover os campos e oferecer oxigênio, caso necessário.
- b) Proceder com a intubação pelo médico, e logo em seguida aspirar e oferecer oxigênio inalatório, se houver cianose central.
- c) Aspiração de orofaringe sob visualização direta e intubação pelo médico.
- d) Oferecer oxigênio inalatório.

QUESTÃO 3) Considerando a importância de se promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, buscando evitar eventos adversos no processo de assistência à saúde e garantir a segurança do paciente, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A etapa de administração de medicamentos é a última barreira para evitar um erro de medicação derivada dos processos de prescrição e dispensação.
- b) Os nove certos garantem que os erros de administração não ocorrerão sendo indispensável adotá-los para melhorar a segurança da assistência prestada.
- c) Registro certo da administração: checar o horário da administração do medicamento no final do plantão, prevenindo-se, assim, os erros de checagem.
- d) Hora certa: deve-se preparar o medicamento com 30 minutos de antecedência, de modo a garantir que a sua administração seja feita sempre no horário correto, para garantir adequada resposta terapêutica.

QUESTÃO 4) Considerando a administração de medicamentos, avalie a situação problema e responda a alternativa CORRETA:

Foi prescrito Gentamicina para a menor O.A.S. Sabendo-se que a dose prescrita foi de 7,5mg/kg/dia, em três tomadas diárias e que O.A.S pesa 6 kg, calcule a dose a ser administrada em cada horário. A apresentação disponível no serviço é 10mg/mL. Qual a dose a ser administrada em cada horário?

- a) 1 mL
- b) 1,5 mL
- c) 2 mL
- d) 2,5 mL

QUESTÃO 5) Considerando a administração de medicamentos, avalie a situação problema e responda a alternativa CORRETA:

Em um paciente adulto hospitalizado foi prescrita etapa de reposição com 1.500mL de soro fisiológico 0,9% em 20 horas, por via endovenosa. Qual o gotejamento em gotas por minuto?

- a) 25
- b) 21
- c) 20
- d) 26

QUESTÃO 6) Como membro da equipe de saúde, o enfermeiro deve estar atento ao rastreamento do câncer de colo de útero. Para o acompanhamento de uma mulher com 25 anos de idade ou mais, que apresenta resultado de exame citopatológico de lesão de baixo grau (LSIL), recomendam que nesta situação, a mulher deva ser acompanhada em serviço de:

- a) Atenção primária e repetir a citologia com seis meses.
- b) Atenção secundária e repetir a citologia em 1 ano.
- c) Atenção secundária ou terciária e repetir a citologia em 3 anos.
- d) Atenção primária e repetir o exame citopatológico em 1 ano.

QUESTÃO 7) Entendendo que um dos grandes desafios no manejo da hemorragia pós-parto é seu diagnóstico em tempo hábil, existem recomendações na assistência para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica, que propõe estratégias para se diagnosticar e estimar a perda volêmica em puérperas. Analise as afirmativas a seguir:

- I) Estimativa visual;
- II) Estimativa por meio de pesagens de compressas;
- III) Estimativa através de parâmetros clínicos;
- IV) Estimativa clínica através do índice de choque (IC);
- V) Estimativa através do uso de dispositivos coletores.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III estão corretas.
- b) II, III e IV estão corretas.
- c) Todas estão corretas.
- d) I, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 8) A estimulação dos mecanismos da coagulação aumenta o risco de tromboembolia no puerpério. Na trombose venosa profunda da panturrilha, a dor pode ser provocada pela dorsiflexão passiva do pé, denominada sinal de:

- a) Hegar.
- b) Piskacek.
- c) Hunter.
- d) Homans.

QUESTÃO 9) A mastite é um processo inflamatório de um ou mais segmentos da mama, geralmente unilateral, que pode progredir ou não para uma infecção bacteriana. Ela ocorre mais comumente na segunda e terceira semanas após o parto, mas pode ocorrer em qualquer período da amamentação. Considerando o manejo em relação à mastite, é CORRETO afirmar:

- a) Suspender o aleitamento materno na mama afetada.
- b) Esvaziar adequadamente as mamas; caso não ocorra o esvaziamento na mamada, deve realizar a ordenha manual.

- c) Oferecer suporte emocional, repouso da mãe, líquidos abundantes, iniciar sempre a amamentação na mama afetada.
- d) Oferecer suporte adequado das mamas com uso de sutiã com alças finas e firmes, a fim de evitar desconforto para a puérpera.

QUESTÃO 10) O câncer do colo do útero, apesar de prevenível, é um dos cânceres mais frequentes em mulheres no Brasil, com altas taxas de incidência e de mortalidade. Quanto às situações especiais para o rastreamento do câncer do colo do útero recomenda-se:

- a) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde para realização de pré-natal.
- b) Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres, sempre proceder à estrogenização previamente à realização da coleta do exame.
- c) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, devem ser excluídas do rastreamento, independente de apresentarem exames anteriores normais.
- d) O exame citopatológico deve ser realizado em mulheres imunossuprimidas após o início da atividade sexual com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento a cada três anos enquanto se mantiver o fator de imunossupressão.

QUESTÃO 11) MDL, 63 anos de idade, GIII PII AI, casada, foi à Atenção Primária à Saúde (APS) com exame de mamografia cujo laudo foi BI-Rads 4. Identifique como o enfermeiro da APS deve interpretar este resultado. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Achados provavelmente benignos.
- b) Achados suspeitos de malignidade.
- c) Achados altamente suspeitos de malignidade.
- d) Achados já com diagnóstico de câncer.

QUESTÃO 12) A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do câncer. Nessa estratégia, destaca-se a importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama, bem como do acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde tanto na atenção primária quanto nos serviços de referência para investigação diagnóstica. São considerados sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama e de referência urgente para a confirmação diagnóstica:

- I. Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade;
- II. Retração na pele da mama;
- III. Qualquer nódulo mamário em mulheres com menos de 30 anos;
- IV. Mudança no formato do mamilo.

Analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA:

- a) I, II e III
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) Todas estão corretas

QUESTÃO 13) A puérpera com uma semana de pós-parto apresenta um estado de fragilidade e hiperemotividade transitória (choro fácil, irritabilidade, tristeza ou hipersensibilidade). O manejo adequado inclui uma orientação sobre a sua frequência e transitoriedade, o estímulo à manifestação de sentimentos e a aceitação de apoio. O enunciado refere-se à:

- a) Depressão gestacional.
- b) Transtorno afetivo bipolar.
- c) Esquizofrenia puerperal.
- d) Baby blues.

QUESTÃO 14) Após o nascimento, o corpo da mulher passa por alterações significativas em todos os sistemas para que possa retornar ao estado pré-gravídico. Considerando os fenômenos involutivos e adaptações fisiológicas maternas na fase do puerpério, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale.

I. A cérvix retorna tipicamente ao seu estado pré-gravídico na segunda semana do período pós-parto.

II. Os lóquios rubro duram 3 dias; depois são lóquios seroso que dura de 4 a 10 dias; em seguida lóquios amarelado com duração de 5 dias; e por último lóquios brancos, que duram de uma a duas semanas. A persistência dos lóquios sanguinolentos pode significar involução uterina e levar à suspeita de infecção por retenção de restos placentários.


III. No sistema tegumentar acontecem as seguintes modificações: o cloasma e linha nigra regridem gradativamente, o hirsutismo desaparece e as estrias tornam-se mais claras.

IV. O útero volta ao seu tamanho normal, devido à supressão de hormônios produzidos pela placenta (estrogênio, progesterona e prolactina).

Analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA:

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II e IV estão corretas.
- c) As afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa I e III estão corretas.

QUESTÃO 15) Uma boa troca gasosa depende de uma adequada razão ventilação/perfusão (V/Q). Considere que o desenho abaixo apresenta a figura de um alvéolo e o seu capilar sanguíneo.



Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA de anormalidades na relação V/Q que está sendo apresentado na figura:

- a) Shunt (A); Espaço Morto (B); Unidade Silenciosa (C).
- b) Espaço Morto (A); Shunt (B); Unidade Silenciosa (C).
- c) Unidade Silenciosa (A); Espaço Morto (B); Shunt (C).
- d) Shunt (A); Unidade Silenciosa (B); Espaço Morto (C).

QUESTÃO 16) Sobre o exame físico e métodos propedêuticos do sistema cardiovascular é CORRETO afirmar que:

- a) São realizadas a inspeção, percussão, palpação e ausculta, em que a percussão é útil para delimitar a área cardíaca e identificar as bulhas cardíacas.
- b) São realizadas a inspeção, percussão, palpação e ausculta, em que na inspeção podemos sentir o Ictus Cordis no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular com as polpas digitais.
- c) São realizadas a inspeção, palpação e ausculta, em que na ausculta pode-se identificar as bulhas cardíacas nos focos por meio de um estetoscópio.
- d) São realizadas a inspeção, palpação e ausculta, em que na inspeção conseguimos auscultar as bulhas cardíacas e sopros.

QUESTÃO 17) Durante o exame físico pulmonar de um paciente, o enfermeiro realizou a inspeção dinâmica da caixa torácica e verificou uma respiração lenta e superficial, com frequência de 10 movimentos respiratórios por minuto e na ausculta verificou ruídos adventícios mais graves, de maior duração, audíveis na inspiração e expiração, com predomínio nesta última fase e que se modificava com a tosse. No caso descrito, o paciente apresentava:

- a) Taquipneia e roncos.
- b) Bradipneia e roncos.
- c) Bradipneia e sibilos.
- d) Apneia e sibilos.

QUESTÃO 18) A prescrição de oxigênio deve respeitar indicações definidas e especificações da dose, sendo um recurso terapêutico eficaz em pacientes com disfunção ou insuficiência respiratória aguda ou crônica. E sua utilização requer cuidados específicos. Assim, com relação à oxigenoterapia assinala a opção CORRETA:

- a) Cateter nasal é um sistema de baixo fluxo, recomenda-se a utilização de um fluxo de até 9 L/min, sendo o uso do umidificador obrigatório.
- b) A pressão parcial de oxigênio menor que 60 mmHg ou saturação de oxigênio inferior a 90% (em ar ambiente) são consideradas indicações para oxigenoterapia.
- c) A oxigenoterapia aumenta a saturação de oxihemoglobina e de gás carbônico arterial.
- d) A máscara de Venturi é um sistema de alto fluxo e, por serem de uso externo, dispensam a necessidade de umidificação.

QUESTÃO 19) Sobre o exame físico pulmonar, analise as afirmativas e marque a alternativa CORRETA.

- a) Paciente refere cansaço aos pequenos esforços e perda de peso recente. História de dispneia, tosse produtiva com expectoração branca. Encontra-se com diminuição da expansibilidade torácica, e roncos em ambos hemitórax. Todos esses dados são classificados como subjetivos e coletados durante a entrevista.
- b) Os métodos propedêuticos devem ser realizados de maneira simétrica e comparativa, considerando-se os referenciais anatômicos e linhas imaginárias da caixa torácica anterior, lateral e posterior.
- c) Durante a inspeção se observa: presença de cicatrizes, forma e simetria do tórax (normal, tonel, cifótico, infundibuliforme, cariniforme), coloração da pele, frêmito tátil, expansibilidade torácica e ressonância vocal.
- d) Na realização do exame físico pulmonar, espera-se na percussão como sons de normalidade: claro pulmonar, maciço e submaciço. E na ausculta pode-se observar a presença de sons de normalidade como: traqueal, brônquico, e ruídos hidroaéreos.

QUESTÃO 20) Considerando a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e os cuidados de enfermagem para o paciente portador dessa patologia, analise as afirmativas.

- () A DPOC é uma enfermidade respiratória com manifestações sistêmicas, caracterizada pelo desenvolvimento progressivo de limitação ao fluxo aéreo que é totalmente reversível.
- () O diâmetro anteroposterior do tórax aumenta devido a hiperinsuflação pulmonar em pacientes nos quais a doença possui um componente enfisematoso primário.
- () Os resultados da exacerbação da DPOC estão relacionados com o desenvolvimento de alcalose respiratória e necessidade de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo.
- () Os broncodilatadores, embora ajudem a excreção de secreções brônquicas, trazem efeitos colaterais, como bradicardia e sonolência.
- () A hidratação oral do paciente com DPOC deve ser feita com cautela, quando este apresenta insuficiência cardíaca direita ou esquerda.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- a) F - V - F - F - V
- b) V - F - F - F - V
- c) V - F - V - F - F
- d) F - V - V - F - V

GABARITO FINAL

01		11	
02		12	
03		13	
04		14	
05		15	
06		16	
07		17	
08		18	
09		19	
10		20	
<hr/> Assinatura do Candidato			