



SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL Nº 152/2023

ÁREA: Enfermagem na média e alta complexidade

PROVA ESCRITA

INSTRUÇÕES

1	Na parte inferior desta capa, escreva o seu nome completo de forma legível.
2	O candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação ou comissão de seleção, telefone celular desligado ou quaisquer equipamentos eletrônicos, também desligados, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado, sob pena de ser eliminado do processo seletivo.
3	A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato, assim como bolsas e sacolas, deverão ser mantidos embaixo da carteira até o término de suas provas. A embalagem somente poderá ser deslacrada fora do local de realização das provas.
4	Este Caderno contém 20 questões de múltipla escolha . Verifique se ele está completo. Se estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.
5	A Prova Objetiva (questões de múltipla escolha) vale 10,0 pontos e cada uma de suas questões tem o mesmo valor.
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
7	Somente é permitido o uso de caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não será considerada a questão marcada com lápis grafite.
8	Utilize o verso das páginas deste Caderno para rascunhos.
9	Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla escolha.
10	Será considerada como resposta definitiva a cada questão o preenchimento do Gabarito Final , na última folha do caderno de provas.
11	Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno de Provas.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO

--

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

QUESTÃO 1)

Em 2017, o Ministério da Saúde lançou o manual de prevenção de infecções relacionadas à assistência. Em relação aos cuidados para prevenção da pneumonia relacionada à assistência, todo paciente que faz uso de ventilação mecânica invasiva (VMI), deve ter cuidados essenciais para evitar este tipo de infecção. Diante disso, e dos cuidados que devem ser inseridos dentre a assistência de enfermagem, quais as principais intervenções que o enfermeiro deve realizar para evitar a pneumonia relacionada à assistência? (valor: 0,5 pontos)

- a) Manter decúbito em grau 0°; Adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea; Aspirar secreção subglótica rotineiramente; Fazer a higiene oral com antissépticos; fazer uso na rotina de bloqueadores neuromusculares (Cisatracúrio); Dar preferência a Ventilação Mecânica Invasiva; Cuidados com o circuito do ventilador (recomendada troca rotineira); Cuidados com Umidificadores (troca entre 48 hrs e 7 dias); Indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado (troca em 7 dias).
- b) Manter decúbito elevado (30 a 45°); Adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea; Aspirar secreção subglótica rotineiramente; Fazer a higiene oral com antissépticos; Dar preferência a Ventilação Mecânica não Invasiva; Cuidados com o circuito do ventilador (não é recomendada troca rotineira); Cuidados com Umidificadores (troca entre 48 hrs e 7 dias); Indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado (troca em 48 hrs); Evitar extubação não programada e reintubação; Monitoramento da pressão do Cuff (18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH₂O).
- c) Sonda enteral na posição gástrica ou pós-pilórica; Dar preferência a intubação orotraqueal; Dar preferência a Ventilação Mecânica Invasiva; Cuidados com o circuito do ventilador (recomendada troca rotineira); Cuidados com Umidificadores (troca entre 48 hrs e 7 dias); Indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado (troca em 48 horas); Cuidados com Inaladores e nebulizadores (troca a cada 48 hrs);
- d) Sonda enteral na posição gástrica ou pós-pilórica; Dar preferência a intubação nasotraqueal; Dar preferência a Ventilação não Mecânica Invasiva; Cuidados com Umidificadores (troca entre 48 hrs e 7 dias); Indicação e cuidados com o sistema de aspiração fechado (troca em 24 hrs); Evitar extubação não

programada e reintubação; Monitoramento da pressão do Cuff (18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH20); Não aspirar secreção subglótica rotineiramente a fim de evitar infecções.

QUESTÃO 2)

Dentre a sistematização da assistência de enfermagem na Unidade de terapia intensiva (UTI) estão os cuidados com a infusão de medicamentos. Quanto ao uso dos vasopressores e o uso do cateter periférico nos pacientes internados na UTI, marque a alternativa correspondente a resposta CORRETA (valor: 0,5 pontos).

- a) Os fármacos vasopressores possuem propriedade vesicantes e induzem a isquemia tecidual local através da ação vasoconstrictora nos vasos sanguíneos.
- b) Os estudos demonstram calibres como 14G e o 16G são mais seguros para a infusão periférica.
- c) Os locais mais próximos da fossa antecubital são considerados áreas hipoperfundidas, possuem vasos mais frágeis, favorecendo o risco de complicações.
- d) Em caso de extravasamento de um vasopressor, interromper a infusão imediatamente, retirar o dispositivo e observar o local durante 12 horas, não sendo necessário administrar antídoto.

QUESTÃO 3)

Para garantir uma boa assistência aos pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI), é necessário garantir um quadro mínimo de profissionais da enfermagem. Sobre o funcionamento deste setor, assinale a alternativa **incorreta** (valor: 0,5 pontos).

- a) Unidade de Terapia Intensiva – Adulto é destinada à assistência de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir pacientes de 15 a 17 anos, se definido nas normas da instituição.
- b) Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados contra tétano, difteria, hepatite B e outros imunobiológicos, de acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
- c) Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.

- d) Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.


QUESTÃO 4)

O enfermeiro intensivista deve possuir conhecimentos específicos para cuidados ao paciente grave. Dentre os cuidados, está o desenvolvimento da assistência de enfermagem (SAE) ao paciente internado na unidade de terapia intensiva (UTI). Para desenvolver os cuidados, o profissional precisa conhecer os modos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Logo, o modo de ventilação mecânica, que permite ao paciente respirar espontaneamente entre as ventilações geradas pelo ventilador, é denominada ventilação (valor: 0,5 pontos):

- a) mandatória contínua.
- b) assistido-controlada.
- c) com pressão controlada.
- d) mandatória intermitente

QUESTÃO 5)

Paciente A.J.M, sexo feminino, 70 anos, internada na unidade de terapia intensiva (UTI) devido um infarto agudo do miocárdio (IAM). A paciente relata que está sentindo “as batidas do coração muito forte”, dor no peito, mal-estar, falta de ar e tontura. O enfermeiro ao verificar o traçado do eletrocardiograma verifica a seguinte imagem. Diante desta, assinale a condição que apresenta essas características (valor: 0,5 pontos):



- a) Ritmo sinusal
- b) Flutter atrial
- c) Taquicardia supraventricular
- d) Fibrilação ventricular

QUESTÃO 6)

Em relação ao acesso venoso periférico em pediatria, marque a alternativa correta (valor: 0,5 pontos):

- a) Selecione o vaso com maior probabilidade de duração, tendo preferência pela área anticubital e desconsiderando as veias da mão, do antebraço e do braço.
- b) Para crianças menores de 03 anos, podem ser consideradas as veias da cabeça. Caso a criança não caminhe, também podem ser consideradas as veias dos pés.
- c) Considerar um cateter de maior calibre, devido necessidade de infusões de medicamentos.
- d) A frequência ideal para avaliação do sítio de inserção em pacientes pediátricos, estáveis e sem déficit cognitivo é a cada 2 horas.

QUESTÃO 7)

O cateterismo Umbilical é um dos procedimentos realizados pelo enfermeiro (capacitado e qualificado) em uma Unidade de terapia intensiva neonatal. O cateterismo umbilical visa estabelecer uma linha de acesso à circulação sanguínea do recém-nascido, podendo ser o acesso venoso ou arterial. Trata-se de um procedimento invasivo utilizado para a infusão de líquidos, monitorização de pressão arterial invasiva, coleta de gasometria arterial, intervenção cardíaca, infusão de drogas e trocas sanguíneas. A partir destas informações, marque a alternativa que corresponde a este procedimento (valor: 0,5 pontos):

- a) Cateteres umbilicais arteriais: preferencialmente, devem ser mantidos por até 7 dias; Cateteres umbilicais venosos: devem ser removidos quando não mais necessários, mas podem permanecer por até 15 dias, desde que mantidos por técnica asséptica.
- b) Cateteres umbilicais arteriais: preferencialmente, devem ser mantidos por até 5 dias; Cateteres umbilicais venosos: devem ser removidos quando não mais necessários, mas podem permanecer de 7 a 14 dias, desde que mantidos por técnica asséptica.
- c) As únicas contraindicações do cateterismo umbilical é a onfalite e a onfalocele.
- d) O cateter umbilical pode permanecer por mais de 15 dias no caso de nutrição parenteral.

QUESTÃO 8)

Em escala mundial, o AVE (acidente vascular encefálico) é a segunda principal causa de morte, ocorrendo predominantemente em adultos de meia-idade e idosos. Nas últimas décadas, o AVC (acidente vascular cerebral) no Brasil vem

liderando entre as principais causas de internações e mortalidade, causando na grande maioria dos pacientes algum tipo de deficiência, seja parcial ou completa. Sobre as manifestações clínicas do AVE Hemorrágico, é correto afirmar (valor: 0,5 pontos):

() A maioria das manifestações clínicas do AVE hemorrágico não diferem do AVE isquêmico, contudo, há manifestações clínicas específicas do AVE hemorrágico.

() A ruptura de um aneurisma ou malformação arteriovenosa (MAV) em geral, produz uma cefaleia súbita e não habitualmente intensa.

() Em algumas situações, o aneurisma ou MAV extravasa sangue, levando a formação de um coágulo que sela o local da ruptura.

() O prognóstico independe da condição neurológica do paciente, idade, doenças associadas, extensão e localização da hemorragia ou aneurisma intracraniano.

Assinale a alternativa CORRETA

a)V-V-V-F

b)F-V-V-F

c)V-V-V-V

d)F-F-V-V

QUESTÃO 9)

Interprete as sentenças abaixo e marque a alternativa CORRETA (valor: 0,5 pontos):

1.O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser dividido em duas categorias principais: Isquêmicos (85% dos casos) e Hemorrágicos (15% dos casos).

2.O AVE Isquêmico ocorre, quando há uma oclusão vascular e uma hipoperfusão significativa, desencadeando uma perda súbita da função cerebral resultante da ruptura do suprimento sanguíneo.

3.O AVE hemorrágico é resultado do extravasamento de sangue para dentro do tecido cerebral ou para o entorno das estruturas do sistema nervoso central.

a)Apenas afirmativas 1 e 2 estão corretas.

b) Apenas a afirmativa 3 está correta.

c)Apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretas.

d)Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10)

Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva descompensada, que apresenta edema em membros inferiores e ausência de pulsos periféricos, tem como diagnósticos da NANDA-I, respectivamente (valor: 0,5 pontos):

- a) Débito cardíaco diminuído e perfusão tissular periférica ineficaz.
- b) Débito cardíaco aumentado e risco de perfusão tissular periférica ineficaz.
- c) Volume de líquidos excessivo e dificuldade respiratória.
- d) Eliminação ineficaz e troca de gases prejudicada.

QUESTÃO 11)

Um paciente de 45 anos deu entrada na unidade hospitalar, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Refere dor irradiando para membros superiores, sudorese e sensação de desfalecimento, após dirigir por um tempo prolongado. Sente-se cansado para respirar. Ao exame físico encontra-se cianótico, taquicárdico (114rpm), dispneico (frequência respiratória de 25 rpm), hipotenso (90x60 mmHg) e com bulhas hipofonéticas. Foram solicitados exames laboratoriais e foi agendado ecocardiograma. Há indicação de cateterismo cardíaco. Considerando esse caso clínico hipotético e a identificação do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I a partir dos fatores relacionados e características definidoras, constata-se (valor: 0,5 pontos):

- a) dor crônica relacionada à isquemia do musculo cardíaco, evidenciada por relato verbal.
- b) medo relacionado ao nervosismo evidenciado por palidez, nervosismo e vômitos.
- c) padrão respiratório ineficaz relacionado à fadiga da musculatura respiratória, evidenciado por hiperventilação, taquipneia e cianose.
- d) risco de padrão respiratório ineficaz relacionado à fadiga da musculatura respiratória, evidenciado por dispneia.

QUESTÃO 12)

O infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região do músculo do coração em decorrência da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. (valor: 0,5 pontos)

Sobre infarto, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O principal sintoma é dor ou desconforto na região peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto e braço esquerdo.

() Os principais fatores de risco para o infarto são o tabagismo e o colesterol em excesso, pois podem se acumular e levar à formação de placas de gordura. A diabetes não é fator de risco para infarto.

() Além da prática regular de exercícios físicos, alimentação adequada e cessação do tabagismo, a prevenção de doenças como a aterosclerose e obesidade é fundamental para evitar a obstrução das artérias e consequente infarto.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) F, F, F

b) V, V, V

c) V, F, V

d) F, F, V

QUESTÃO 13)

O enfermeiro deve ter conhecimentos básicos em relação a eletrocardiografia de modo que contribua para avaliar o paciente quanto ao seu estado de saúde em decorrência de problemas cardíacos. Perante o exposto, o enfermeiro pode afirmar que (valor: 0,5 pontos) :

a) a onda "P" representa repolarização atrial e antecede o complexo "QRS".

b) a onda "T" representa a despolarização dos ventrículos e localiza-se após o complexo "QRS".

c) em um ECG, se eu tenho 12 quadradinhos do papel milimétrico entre duas ondas "R" consecutivas, isso indica uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto.

d) cada derivação produz formas de ondas características com base na direção do fluxo de corrente elétrica e representa áreas específicas do coração. As derivações DII, DIII e AVF representam a parede inferior do coração.

QUESTÃO 14)

Paciente J. N. M., 65 anos, encontra-se internada na clínica médica e começa a apresentar rebaixamento do nível de consciência, sendo realizada gasometria arterial que apresentou os seguintes resultados: PH= 7, 22; PaCO₂= 70 mmHg; PaO₂= 89 mmHg; HCO₃= 25,2 mEq/L, BE= -3. Nesse contexto, o enfermeiro deve interpretar esses resultados como (valor: 0,5 pontos):

a) acidose respiratória.

b) alcalose respiratória.

- c) acidose metabólica.
- d) alcalose metabólica.

QUESTÃO 15)

A assistência de enfermagem precisa, eficiente e fundamentada em evidência, é fundamental para garantir o cuidado adequado do paciente portador de doenças renais. Quanto as orientações de enfermagem voltada as afecções renais, é incorreto afirmar (valor: 0,5 pontos):

- a) A enfermagem deve reconhecer a alteração renal e orientar melhor quanto a ingesta de líquidos e tipos de medicamentos para manter a filtração glomerular adequada.
- b) Quando em atendimento ao acometido por lesão renal aguda pré-renal por desidratação, deve-se orientar a ingesta líquida adequada e realização de exames de dosagem de uréia e creatitina
- c) O tratamento hemodialítico deve ser acompanhado pela equipe de enfermagem para evitar complicações e proporcionar a cura da lesão renal inicial.
- d) Uma das orientações quando em aparecimento de infecções renais é a ingesta líquida adequada e uso de roupas “frias”.

QUESTÃO 16)

Quanto a meningite pode-se afirmar que é uma patologia que acomete as meninges, podendo levar a pessoa a morte. Sobre o tratamento de enfermagem marque a alternativa correta (valor: 0,5 pontos):

- a) Deve ser realizada a administração de anti-inflamatórios venosos sem restrição ao leito.
- b) Deve ser realizada a administração de antibióticos conforme prescrição e restrição ao leito com vacinação de comunicantes.
- c) Indica-se apenas a vacinação de comunicantes.
- d) Indica-se restrição ao espaço social familiar, sem restrição de leito.

QUESTÃO 17)

A resolução COFEN nº 569/2018 regulamenta a atuação dos Profissionais de Enfermagem nos serviços de quimioterapia antineoplásica. São competências privativas do Enfermeiro em quimioterapia antineoplásica (valor: 0,5 pontos):

I. Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de Enfermagem, em clientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um serviço de alta complexidade.

II. Participar da definição da política de recursos humanos, da aquisição de material e da disposição da área física, necessários à assistência integral aos clientes.

III. Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem na prevenção, tratamento e minimização dos efeitos colaterais.

IV. Formular e implementar manuais educativos aos clientes e familiares, adequando-os à sua realidade social.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV
- b) II, III e IV apenas
- c) III e IV apenas
- d) I e III apenas

QUESTÃO 18)

A equipe de enfermagem presta cuidados diretos e contínuos aos pacientes em tratamento hemodialítico, seja no pré, trans ou pós diálise. Quanto ao reuso de dialisadores em hemodiálises. é **incorreto** afirmar (valor: 0,5 pontos):

- a) vedado reuso de pacientes com sorologia positiva para hepatite B, hepatite C (tratados ou não) e HIV.
- b) no caso da esterilização química líquida, os dialisadores devem ser submetidos ao enxágue na máquina de hemodiálise, para remoção da solução esterilizante imediatamente antes do início da diálise.
- c) o profissional do serviço deve apresentar ao paciente o dialisador, devidamente identificado com o registro da data do primeiro uso, antes de ser submetido à hemodiálise.

- d) os dialisadores podem ser utilizados para o mesmo paciente no máximo 30 (trinta) vezes, após ser submetido ao processamento automático, observando-se a medida mínima permitida do volume interno das fibras.

QUESTÃO 19)

Nos cuidados paliativos, a enfermagem atua em equipes interdisciplinares, buscando oferecer um cuidado profissional que reduza o sofrimento e promova o conforto e a dignidade do paciente e da família, atendendo as necessidades básicas de saúde física, emocional, espiritual e social. Com relação ao manejo da dor em cuidados paliativos, assinale a alternativa incorreta (valor: 0,5 pontos):

- a) A equipe de enfermagem tem responsabilidade na avaliação Diagnóstica, na intervenção e monitoração dos resultados, no tratamento e na comunicação das informações da dor do paciente para os demais membros da equipe.
- b) A equipe de enfermagem deve estimular a família a se afastar aos poucos do paciente, enfrentando assim o processo.
- c) A dor interfere diretamente na qualidade de vida dos pacientes que podem ter como uma das consequências o comportamento alterado, como irritabilidade, agressividade, agitação.
- d) A avaliação da dor em pacientes não comunicantes é um desafio, sendo necessário a vigilância da equipe de enfermagem nestes casos.

QUESTÃO 20)

Paciente do sexo masculino, 43 anos, chegou ao serviço de saúde acompanhado da esposa. O paciente apresentava dificuldade visual, dificuldade para falar e entender comandos simples, confusão mental e desvio de rima. Esse paciente foi encaminhado para a unidade de emergência, pois, de acordo com o quadro apresentado, trata-se (valor: 0,5 pontos):

- a) de uma contusão pulmonar.
- b) de um infarto agudo do miocárdio.
- c) de um tamponamento cardíaco.
- d) de um acidente vascular encefálico.

A QUANTIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS É DECIDIDA PELA BANCA

GABARITO FINAL			
01		11	
02		12	
03		13	
04		14	
05		15	
06		16	
07		17	
08		18	
09		19	
10		20	
<hr/> Assinatura do Candidato			